

BOVILIS® VISTA ONCE SQ

Solución Inyectable

Reg. SAGARPA Q-0273-192

VISTA RÁPIDA DEL PRODUCTO

Prevención de la enfermedad respiratoria causada por IBR, BVD (tipo 2), BRSV; y como una ayuda en el control de las enfermedades causadas por BVD (tipo 1), PI3, Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida.

VISTA GENERAL

Vacuna para el ganado

BOVILIS® VISTA ONCE SQ

Vacuna liofilizada

Reg. SAGARPA Q-0273-192

Para la vacunación de bovinos sanos no gestantes, de 3 meses de edad o mayores, como una ayuda en la prevención de las enfermedades respiratorias causadas por IBR, BVD (tipo 2), BRSV; y como una ayuda en el control de las enfermedades causadas por BVD (tipo 1), PI3, Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida.

La duración de la inmunidad en las vías respiratorias (DOI) 182 días para IBR, no menos de 206 días para la BVD (tipo 1) y al menos 200 días para la BVD (tipo 2). Becerros que se alimentan de madres inmunes, deben ser vacunados cuando los niveles de anticuerpos maternos permitan la inmunización activa. Además, BOVILIS® VISTA ONCE SQ se recomienda para la vacunación de vacas y vaquillas sanas antes de la monta como una ayuda en la prevención de la infección fetal, incluyendo la presencia de becerros persistentemente infectados a causa del virus de la BVD (tipos 1 y 2); y como una ayuda en la reducción de abortos debidos a IBR. La duración de la inmunidad (DOI) en el aparato reproductor se ha demostrado que es de al menos 217 días para IBR y no menos de 206 días para la BVD (tipos 1 y 2).

COMPOSICIÓN FÓRMULA:

Vacuna contra la rinotraqueítis infecciosa bovina, diarrea viral bovina, parainfluenza tipo 3, enfermedad respiratoria sincitial bovina Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida. Virus activos modificados y cultivo vivo avirulento.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Inyectar 2.0 ml por vía subcutánea a bovinos sanos de 3 meses de edad o mayores. Se recomienda la revacunación anual.

Para la revacunación se puede administrar una dosis a intervalos más frecuentes basados en la evaluación del riesgo u otras condiciones de epidemia que existen o son reportadas en cada explotación. Consulte al Médico Veterinario.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO:

Frascos de 5 o 10 dosis (10-20 ml). Rehidratar el vial de la vacuna liofilizada BOVILIS® VISTA ONCE SQ con el diluyente incluido. Mezclar bien el vial reconstituido. Frascos de 50 o 10 dosis (100 o 200 ml). Rehidratar el vial de la vacuna liofilizada BOVILIS® VISTA ONCE SQ con una parte del diluyente incluido utilizando la aguja de transferencia (véase el instructivo ilustrado de indicaciones).

Mezclar bien el vial reconstituido y transferir la vacuna rehidratada en el vial del diluyente con la aguja de transferencia. Retire la aguja de transferencia del vial de diluyente y mezcle

bien el vial reconstituido. Jale la etiqueta del vial de BOVILIS® VISTA ONCE SQ y colóquela sobre el vial del diluyente que contiene la vacuna rehidratada.

PRECAUCIONES:

Almacenar en refrigeración a 2-7°C (35-45°F). No congelar. Utilizar inmediatamente después de reconstituida; no guardar remanentes de la vacuna. Incinerar los viales y todo el contenido sobrante. Utilizar sólo en bovinos sanos.

No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Puede usarse en hembras gestantes y en becerros que estén lactando de hembras gestantes si éstas tienen una vacunación previa dentro de los 12 meses anteriores con vacunas virales de la línea Vista y siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

Si se presentan reacciones alérgicas, administre epinefrina.

Contiene penicilina y estreptomina como conservadores